

## ПЕРЕЧЕНЬ

### Приложение 1

Видов водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации, Каспийского моря, общий допустимый улов которых не устанавливается, объемов и районов их добычи (вылова)

(тонн)

#### Таблица 1

#### Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

#### Чукотское море

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Сайка                                         | 1 697,000 |
| Кольчатая нерпа (акиба), шт.                  | 761       |
| Морской заяц (лахтак), шт. <sup>1</sup>       | 1630      |
| Обыкновенный тюлень (ларга), шт. <sup>2</sup> | 600       |
| Полосатый тюлень (крылатка), шт. <sup>3</sup> | 180       |

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) морского зайца (лахтака) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины;

<sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) обыкновенного тюленя (ларги) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины;

<sup>3</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) полосатого тюленя (крылатки) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины.

### Зона Чукотская

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Сайка                                         | 339,500 |
| Сельдь тихоокеанская <sup>1</sup>             | 198,000 |
| Кольчатая нерпа (акиба), шт. <sup>2</sup>     | 1 465   |
| Морской заяц (лахтак), шт. <sup>3</sup>       | 732     |
| Обыкновенный тюлень (ларга), шт. <sup>4</sup> | 447     |
| Полосатый тюлень (крылатка), шт. <sup>5</sup> | 793     |

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сельди тихоокеанской между Чукотской и Западно-Беринговоморской зонами без превышения суммарной величины;

<sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) кольчатой нерпы (акибы) между Чукотской и Западно-Беринговоморской зонами без превышения суммарной величины;

<sup>3</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) морского зайца (лахтака) между зонами Чукотского море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины;

<sup>4</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) обыкновенного тюленя (ларги) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины;

<sup>5</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) полосатого тюленя (крылатки) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины.

### Западно-Беринговоморская зона

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Камбалы дальневосточные           | 17 372,300  |
| Мойва                             | 3 399,460   |
| Навага                            | 1 974,100   |
| Палтус стрелозубый                | 1 327,500   |
| Сайка                             | 1 259,500   |
| Сельдь тихоокеанская <sup>1</sup> | 243 353,110 |
| Скаты                             | 2 811,500   |
| Угольная рыба                     | 3 836,980   |
| Краб-стригун ангулятус            | 150,000     |
| Креветка северная                 | 924,000     |
| Креветка углохвостая              | 498,800     |
| Шримсы козырьковые                | 123,000     |



|                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Шримсы-медвежата                                                                                                                                                                                                   | 69,000     |
| Кальмар командорский                                                                                                                                                                                               | 29 997,180 |
| Трубачи                                                                                                                                                                                                            | 99,500     |
| Кольчатая нерпа (акиба), шт. <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 161        |
| Морской заяц (лахтак), шт. <sup>3</sup>                                                                                                                                                                            | 269        |
| Обыкновенный тюлень (ларга), шт. <sup>4</sup>                                                                                                                                                                      | 1 049      |
| Полосатый тюлень (крылатка), шт. <sup>5</sup>                                                                                                                                                                      | 2 000      |
| <sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сельди тихоокеанской между Чукотской и Западно-Беринговоморской зонами без превышения суммарной величины;                         |            |
| <sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) кольчатой нерпы (акибы) между Чукотской и Западно-Беринговоморской зонами без превышения суммарной величины;                      |            |
| <sup>3</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) морского зайца (лахтака) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины;     |            |
| <sup>4</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) обыкновенного тюленя (ларги) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины; |            |
| <sup>5</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) полосатого тюленя (крылатки) между зонами Чукотское море, Чукотской и Западно-Беринговоморская без превышения суммарной величины. |            |

# Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Корюшка малоротая                | 156,900    |
| Скаты                            | 238,500    |
| Угольная рыба                    | 195,790    |
| Кальмар командорский             | 14 999,990 |
| Ламинарии                        | 999,000    |
| Кольчатая нерпа (акиба), шт.     | 339        |
| Обыкновенный тюлень (ларга), шт. | 133        |
| Полосатый тюлень (крылатка), шт. | 16         |

## Восточно-Камчатская зона, Петропавловско-Командорская подзона

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Сайра <sup>1</sup>               | 1 000,000 |
| Сельдь тихоокеанская             | 56,250    |
| Скаты                            | 277,800   |
| Угольная рыба                    | 39,390    |
| Мидии                            | 49,000    |
| Морской еж зеленый               | 10,408    |
| Морской еж многоиглый            | 33,958    |
| Ламинарии                        | 998,850   |
| Обыкновенный тюлень (ларга), шт. | 42        |

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сайры между Петропавловско-Командорской подзоной, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины.

### Северо-Курильская зона

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Анчоусы <sup>1</sup>       | 500,000     |
| Палтус стрелозубый         | 149,400     |
| Сайра <sup>2</sup>         | 998,400     |
| Сардина иваси <sup>3</sup> | 199 593,500 |
| Скаты                      | 998,100     |
| Скумбрия <sup>4</sup>      | 9 800,000   |
| Кальмар тихоокеанский      | 899,980     |
| Ламинарии                  | 2 640,000   |

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) анчоусов между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

<sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сайры между Петропавловско-Командорской подзоной, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

<sup>3</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сардины иваси между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;



<sup>4</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины.

### Южно-Курильская зона

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Акулы                      | 197,870     |
| Анчоусы <sup>1</sup>       | 9 169,920   |
| Гипероглиф                 | 68,000      |
| Корифена                   | 40,000      |
| Корюшка малоротая морская  | 8,300       |
| Лакедра желтохвостая       | 28,000      |
| Лемонема                   | 12 000,000  |
| Лещ морской                | 199,850     |
| Палтус стрелозубый         | 519,700     |
| Сайра <sup>2</sup>         | 15 694,700  |
| Сардина иваси <sup>3</sup> | 879 959,500 |
| Скаты                      | 1 391,540   |
| Скумбрия <sup>4</sup>      | 119 972,150 |
| Тунцы                      | 499,920     |
| Кальмар Бартрама           | 13 999,650  |
| Кальмар тихоокеанский      | 11 453,520  |
| Осьминог песчаный          | 119,700     |
| Спизула                    | 400,000     |

Алария

Анфельция

Костария ребристая

Ламинарии

7 177,960

7 159,980

11 537,920

113 839,300

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) анчоусов между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

<sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сайры между Петропавловско-Командорской подзоной, Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

<sup>3</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) сардины иваси между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины;

<sup>4</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скумбрии между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины.

### Охотское море

#### Северо-Охотоморская подзона

Коряшка малоротая морская

Ликоды

Мойва

Навага

Окунь морской

276,785

297,500

121,373

1 899,127

52,500



|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Скаты                            | 1 193,000 |
| Треска                           | 2 254,380 |
| Креветка гренландская            | 14,980    |
| Креветка углохвостая             | 1 254,600 |
| Шримсы козырьковые               | 222,000   |
| Шримсы-медвежата                 | 269,950   |
| Мия                              | 13,850    |
| Перонидия                        | 3,910     |
| Силиква                          | 1,940     |
| Морской еж зеленый               | 199,700   |
| Ламинарии                        | 399,100   |
| Кольчатая нерпа (акиба), шт.     | 463       |
| Морской заяц (лахтак), шт.       | 124       |
| Обыкновенный тюлень (ларга), шт. | 646       |
| Полосатый тюлень (крылатка), шт. | 200       |

### Западно-Камчатская подзона

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Корюшка малоротая морская | 50,000  |
| Ликоды                    | 299,000 |
| Мойва <sup>1</sup>        | 800,000 |
| Скаты <sup>2</sup>        | 632,000 |
| Шримсы козырьковые        | 3,000   |
| Шримсы-медвежата          | 60,000  |

## Ламинарии

Кольчатая нерпа (акиба), шт.

99,000

Обыкновенный тюлень (ларга), шт.

15

Полосатый тюлень (крылатка), шт.

424

98

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины;

<sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скатов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины.

## Камчатско-Курильская подзона

## Ликоды

Мойва<sup>1</sup>

998,000

Скаты<sup>2</sup>

800,000

## Ламинарии

724,000

Обыкновенный тюлень (ларга), шт.

99,000

343

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины;

<sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скатов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины.

### Восточно-Сахалинская подзона

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Корюшка малоротая                | 145,140    |
| Корюшка малоротая морская        | 890,780    |
| Краснопёрки-утай дальневосточные | 865,342    |
| Ликоды                           | 899,100    |
| Мойва                            | 1 414,124  |
| Песчанки                         | 1 000,000  |
| Сардина иваси                    | 99 987,000 |
| Сельдь тихоокеанская             | 91 000,000 |
| Скаты                            | 1 098,600  |
| Скумбрия                         | 1 000,000  |
| Спизула                          | 524,000    |
| Ламинарии                        | 8 799,650  |
| Кольчатая нерпа (акиба), шт.     | 382        |
| Морской заяц (лахтак), шт.       | 97         |
| Обыкновенный тюлень (ларга), шт. | 400        |
| Полосатый тюлень (крылатка), шт. | 100        |
| Тунцы                            | 30,000     |



**Японское море**  
**Подзона Приморье**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Анчоусы                 | 4 799,400  |
| Камбалы дальневосточные | 11 896,370 |
| Кефали                  | 19,950     |
| Корюшка малоротая       | 1 756,248  |
| Краснопёрки-угаи        | 510,293    |
| дальневосточные         | 712,194    |
| Лакедра желтохвостая    |            |
| Мойва                   | 29,850     |
| Навага                  | 490,558    |
| Рыба-лапша              | 2 763,224  |
| Рыба-собака             | 29,970     |
| Сайра                   | 471,930    |
| Сардина иваси           | 7 799,835  |
| Скаты                   | 4 796,150  |
| Скумбрия <sup>1</sup>   | 1 097,500  |
|                         | 798,050    |
| Терпуги                 | 9 987,020  |
| Тунцы                   | 50,000     |
| Мизиды                  | 49,990     |
| Глицимерис              | 53,850     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Каллиста                          | 44,890     |
| Каллитака                         | 4,950      |
| Кальмар командорский <sup>2</sup> | 8 000,000  |
| Кальмар тихоокеанский             | 15 514,685 |
| Мактра                            | 89,900     |
| Мерценария Стивенса               | 1 199,800  |
| Мидии                             | 1 675,610  |
| Мия                               | 11,900     |
| Осьминог Дофлейна гигантский      | 89,500     |
| Осьминог песчаный                 | 170,850    |
| Перонидия                         | 2,900      |
| Петушок                           | 14,870     |
| Сердцевидка                       | 2,890      |
| Серрипес                          | 199,940    |
| Морской еж палевый                | 9,500      |
| Плоские ежи                       | 49,800     |
| Асцидии                           | 19,460     |
| Медузы                            | 4 999,810  |
| Анфельция                         | 999,000    |
| Зостера                           | 2 399,540  |
| Сахарина                          | 499,800    |
| Тихокарпус косматый               | 0,900      |
| Фукусы                            | 1,000      |
| Хондрус                           | 0,900      |

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море без превышения суммарной величины;

<sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море без превышения суммарной величины.

### Западно-Сахалинская подзона

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Анчоусы                           | 1 999,980  |
| Кефали                            | 199,900    |
| Корюшка малоротая                 | 79,220     |
| Корюшка малоротая морская         | 353,470    |
| Красноперки-угаи дальневосточные  | 220,195    |
| Мойва                             | 14 436,140 |
| Навага                            | 1 037,185  |
| Рыба-лапша                        | 20,700     |
| Сардина иваси                     | 9 998,600  |
| Скаты                             | 615,000    |
| Скумбрия <sup>1</sup>             | 999,600    |
| Тунцы                             | 200,000    |
| Креветка углохвостая              | 10,000     |
| Кальмар командорский <sup>2</sup> | 2 000,000  |



Кальмар тихоокеанский

999,750

Осьминог Дофлейна гигантский

260,000

Осьминог песчаный

144,000

Ламинарии

5 099,750

<sup>1</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) скумбрии между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море без превышения суммарной величины;

<sup>2</sup> Допустимо перераспределение рекомендованных объёмов добычи (вылова) кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной зоны Японское море без превышения суммарной величины.

Таблица 2

## Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн

## Черное море

Акулы<sup>1</sup>

56,000

Атерина<sup>1</sup>

259,000

Барабуля<sup>1</sup>

1 072,000

Бычки<sup>2</sup>

102,000

Горбыль темный<sup>1</sup>

24,000

Камбала-глосса

20,000

Камбала-калкан<sup>3</sup>

754,000